

CASOS CLÍNICOS

RUPTURA DEL BICEPS

El día 3 de Agosto ingresó á este Hospital un caballo que claudicaba del miembro anterior izquierdo hacía ya una semana.

Antecedentes. — Ha estado atacado dos veces, de cólicos por coprostasis, los que fueron tratados en este mismo Hospital por la administración de pilocarpina y eserina.

Estado actual. — Las funciones generales bien, temperatura 38°.

A simple vista se observa que la mano enferma es elevada hacia adelante, siendo la rodilla el punto más saliente de la curva que describe este miembro estando en apoyo.

El acto de retroceder es muy difícil; existen ligeros temblores en la región escapular.

Después de haber procedido al examen de las diversas regiones, encuentro un poco debajo de la articulación escápulo-humeral el único punto sensible.

A la palpación en dicha región, noto un espacio formado por la separación de las fibrillas musculares desgarradas del músculo coraco-radial.

Diagnóstico. — Basado sobre este último síntoma principalmente y sobre la existencia de un pequeño tumorcito formado por la parte carnosa del músculo desgarrado, hago el diagnóstico de rupturas fibrilares del biceps.

Tratamiento. — Aplicación de unguento vejigatorio primero y masajes después.

El día 13 de Agosto se le pasó una nota á su dueño en la que se le comunicaba que el caballo se hallaba completamente sano; fué retirado tres días después.

Desde entonces ha seguido prestando servicios sin que haya claudicado una vez según comunicación de su dueño.

J. C. Sampietro.
Ayudante de Clínica