

DERMATOBIA CYANIVENTRIS O NOXIALIS

URA DE MISIONES.—BICHO BERNE DEL BRASIL (1)

OTRO FLAJELO PARA LA GANANDERIA QUE SE DIFUNDE AL SUD
DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Contribución á la expansión Sud de su área geográfica

La oportunidad de mi permanencia, durante 19 días en una Fazenda de Minas Geraes — Brasil — propiedad del distinguido Ingeniero Dr. João Teixeira Soares, donde desempeñaba una comisión especial, confiada por el Gobierno de la Union, para dilucidar un problema que mantenía desde largo tiempo preocupado al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, por causa de una enfermedad, que atacando á la especie equina, se oponía á la cría de pura sangre, una de las explotaciones á que se dedica ese establecimiento ocasionando la pérdida de ingentes capitales, dado el tezon con que persigue tal fin ese pioner entusiasta, para lograr un tipo de carrera Nacional; me brindó, la ocasión de conocer al Bicho Berne.

El tiempo de que dispuse, me imposibilitó para practicar algunas investigaciones abordando, sobre todo puntos oscuros de su biología, como ser el concerniente á la

(1) Una buena descripción, ha sido dada por el Dr. Serres en el núm. 60—*Gaceta Rural*.

manera de implantar su larva con marcada preferencia en el tejido conjuntivo sub-cutáneo.

Pude conseguir dos ejemplares larvales, extrayéndolos de tumores sub-cutáneos, operando á un perro Danés de la jauría del establecimiento y otras del Zebú encontrándolas en varios estados, desde muy pequeñas hasta su desarrollo completo.

He notado en algunas de las excavaciones que albergan al parásito, alrededor de los orificios evacuantes unos picotazos sanguinolentos que al decir de los naturales son producidos por un pájaro que los extrae para alimento.

Reflexionando sobre la extensión probable del límite Sud de su área geográfica, imaginé pudiera alcanzar la región de Uruguayana, por lo que aprovechando de mi estadía en esa localidad, mientras aguardaba la llegada de los instrumentos para instalar un laboratorio bacteriológico, del mismo Gobierno, intenté su busca, obteniendo, después de múltiples tentativas fracasadas, una larva muy pequeña, en una vaca Durham, tampera, nacida en la región.

Poseedor de esa constatación, utilicé en mis frecuentes viajes á Paso de los Libres, todas las ocasiones tendientes á buscarla, alcanzando felizmente éxito, por haber encontrado ejemplares pequeños en una tropa sometida á mi examen de inspección, criada en los alrededores de ese pueblo.

Esta doble comprobación parece demostrar, que el insecto alado existe en esos lugares, porque en los casos referidos, no se trata de tropas en tránsito, procedentes de Misiones, en las cuales no sería difícil hallarlo.

Llamo la atención sobre este punto, de suma importancia, para considerarlo bajo el criterio de Policía Sanitaria Animal.

Simultáneamente, notamos que su expansión territorial hacia el Sud, es evidente como ocurrió con la Garrapata y en sentido contrario, es decir de Sud á Norte con *Gastrophile Duodenal*, diferenciado la primera vez en el país por Piazza A. en tres puntos distanciados: Arroyo Corto—

Lamadrid—Provincia de Buenos Aires y Miguel Cané,
Pampa Central.

Con la prudencia consiguiente, puede admitirse como
conclusión: Que la Ura extiende hacia el Sud, el dominio
de su área geográfica, donde provocará trastornos cre-
cientes á la industria cueril, lo que obligará al S. Go-
bierno á preocuparse de su confinamiento.

DR. A. PIAZZA.