

La duda es siempre permitida, siempre posible en la causa. Peor cuando se trata de la vida humana, acepto voluntariamente la máxima de este querido y deplorado gran maestro de la veterinaria que se llamó Enrique Bouley: *En la duda, no te abstengas.*

La infección de la leche de las vacas tuberculosas, *posible*, por la mama misma, es *siempre cierta* por el contagio venido de afuera: humor nasal, baba, pesebres contaminados y materias excrementicias adheridas á la piel de las vacas lecheras.

Concluyo de todo esto, que es un deber de todo hombre honrado, el rechazar completamente la leche cruda de la alimentación del hombre, como de los animales domésticos, y negar totalmente, a los productores de leche, la venta de este producto, *mil veces mas peligroso* que la carne de los animales decomisados en los mataderos por causa de *tuberculosis* aun *generalizada*.

Es por todos estos motivos muy graves para la salud pública y la vida de mis conciudadanos, que he emprendido la lucha contra los productores de leche contaminada, y que desearía ver á algunos legisladores, dignos de este nombre, pedir la prohibición formal de la venta de la leche natural á todo productor que no presente como garantía, al alcalde ó comisario de su distrito una patente limpia de los animales de su propiedad, en que conste la no existencia de la tuberculosis, sobre todo en las vacas lecheras.

Cuando se reflexiona un poco en el inmenso desastre que causa cada año, en la población humana la enfermedad tuberculosa, que mata millones de personas de ambos sexos, la flor de la población, creo que es una cuestión digna de estudio y de sumo interés.

Sería tiempo de concluir de una vez con el maldito mal; siendo la vigilancia de los tambos uno de los principales elementos de esta victoria



## REVISTA CLINICA

Por el profesor médico-veterinario Dr. Julio Lejeune

### NEUROTOMIA DEL MEDIANO

El caballo objeto de esta relación nos fué presentado por el Sr. Gabarri el día 12 de Setiembre.

El enfermo manqueaba fuertemente de la mano derecha y tenía en la región de la corona una forma, es decir, un tumor huesoso del volúmen de un huevo de paloma.

Después de aplicar inútilmente puntas de fuego seguidas del veji-

gatorio mercurial, hicimos la operación de la neurotomía del mediano.

Tres semanas después de la operación, el caballo salía de nuestros hospitales curado por completo.

*Posición del caballo.* Se acuesta el caballo del lado del miembro que debe sufrir la operación.

Se fija el miembro opuesto sobre la extremidad inferior de la pierna del mismo lado.

*Lugar de elección.* A la cara interna del antebrazo, un poco arriba de la castaña o espejuelo.

*Modo operatorio.* Con el bisturí derecho se practica longitudinalmente la incisión de la piel y de la aponurosis antibraquial en una extensión de 5 centímetros. El dedo índice introducido entre los flexores interno y oblicuo del metacarpo encuentra sin dificultad el nervio mediano acompañado de la arteria radial posterior y de la vena del mismo nombre.

Se atrae el nervio al exterior y se lo corta.

## MANQUERA DE LAS OVEJAS

La manquera de las ovejas es ciertamente una de las enfermedades contagiosas que mas estragos hace en la República Argentina. Siendo esta afección muy conocida de todos los estancieros no describiré los síntomas que la caracterizan; solamente haré conocer las causas, la marcha, la profilaxia y el tratamiento que mejor conviene para curar los estragos de la enfermedad.

**CAUSAS.** Son predisponentes y determinantes.

*Causas predisponentes.* La humedad; los campos húmedos; las estaciones lluviosas; la mala higiene. Las razas perfeccionadas son mas predisuestas que las otras.

*Causa determinante.* El contagio.

**MARCHA.** La enfermedad tiene una marcha continua, se propaga con suma facilidad sobre todo cuando las ovejas viven en los corrales.

En una majada, la afección dura meses y hasta mas de un año si un tratamiento inteligente no viene á detener el mal en su marcha invasora. La enfermedad es grave no tanto por la mortandad que produce sino por el atraso que sufren las majadas con su propagación.

**PROFILAXIA.** 1º Dividir los animales sanos y enfermos en dos grupos completamente aislados y sin ninguna comunicación inmediata ó mediata, con caminos y campos especiales.

2º Desinfección del suelo de los galpones; de los corrales.

3º Impedir que las ovejas pasten en terrenos bajos y anegadizos.

TRATAMIENTO. Un punto esencial para curar, es de tratar al principio de la enfermedad.

En el primer período de la afección basta para curar hacer pasar las ovejas en una lechada de cal. Se coloca, al efecto, á la entrada del corral una caja de madera de 10 centímetros de profundidad conteniendo una lechada de cal ó una solución de sulfato de cobre ó de sulfato de hierro. Así, las ovejas toman un baño de pié á la entrada y á la salida del corral. En el segundo período, se debe sacar el cuerno despegado y aplicar por medio de un pincelito, el ácido nítrico, el ácido fénico, la creosota, etc.

En el tercer período, hay que llamar á un Veterinario.

### ABLACION TOTAL DEL PENE EN UN CABALLO

Se trata de un caballo perteneciente al señor Celestino Verges que tuvo entrada en nuestros hospitales el día 31 de Agosto.

Presentaba el enfermo los síntomas siguientes:

El pene se encontraba fuera del forro en una extensión de 30 centímetros y su volúmen considerable impedía que reentrara en su vaina natural. Grietas profundas surcaban la superficie del órgano y secretaban un líquido de olor fétido. Según los datos suministrados por el propietario hacía 5 meses que el caballo padecía ese mal y era á consecuencia de la castración. El pus de las llagas había corrido en abundancia sobre el pene y había determinado la producción de un tejido fibroso patológico que formaba la masa mas grande del tumor. Vimos pronto que los recursos terapéuticos eran inútiles y que solo los medios quirúrgicos podían curar el mal.

*Modo operatorio.* Visto el número y el volúmen de los vasos de esta región, aplicamos una ligadura elástica bien apretada sobre la base del pene. Disecamos la uretra en una extensión de 5 centímetros y por medio de un bisturí bien afilado, cortamos transversalmente todos los tejidos del órgano menos la uretra. Para detener la hemorragia producida cauterizamos con el fierro caliente teniendo cuidado de respetar la uretra. Unas 3 horas despues de la operación sacamos la ligadura elástica y apenas se derramaron unas gotas de sangre.

Sería escusado decir que durante el tiempo de la operación observamos escrupulosamente las prescripciones de la asepsia y antisepsia indispensables para el buen éxito de toda operación quirúrgica.

Cinco semanas despues de la operación salió el enfermo de nuestros hospitales, curado por completo.